

# پیداواری منصوبہ

لہسن

2019-20

## پیداواری منصوبہ لہسن 2019-20

### اہمیت

لہسن ایک اہم مصالحہ دار سبزی ہے جو پاکستان کے ہر حصہ میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ عموماً ہر کاشتکار حسب ضرورت تھوڑا بہت رقبہ لہسن کے زیر کاشت لاتا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیقات سے معلوم کیا ہے کہ لہسن دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کے علاج کے لیے مفید ہے۔ اس لیے اس کے استعمال میں مزید اضافہ کا امکان ہے اور اب خشک لہسن کا پاؤڈر اور اچار بھی ڈبوں میں دستیاب ہے۔

### پنجاب میں پچھلے پانچ سالوں میں لہسن کے زیر کاشت کل رقبہ، کل پیداوار اور اوسط پیداوار

سال	رقبہ		کل پیداوار		اوسط پیداوار
	ہیکٹر	ایکڑ	ٹن	کلوگرام فی ہیکٹر	
2013-14	3163	7816	25579	8087	87.68
2014-15	3128	7729	25079	8018	86.93
2015-16	3066	7577	24143	7874	85.37
2016-17	3153	7791	25187	8173	86.61
2017-18	3363	8310	27442	8160	88.47

### آب و ہوا

لہسن کی کاشت کے وقت ٹھنڈے موسم، چھوٹے دنوں اور پکتے وقت خشک اور گرم موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔

### موزوں زمین اور اس کی تیاری

لہسن کی کاشت کے لیے زرخیز اور نرم زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھاری زمین میں گنڈھیاں باقاعدگی سے نہیں بنتیں۔ علاوہ ازیں برداشت کے وقت زمین خشک ہو تو گنڈھیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور زخمی ہو جاتی ہیں اور جنس کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ اسی طرح ریٹلی زمین بھی اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں کیونکہ ایسی زمین میں نمی برقرار کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ گوبر کی گلی سڑی کھاد بحساب 20 تا 25 ٹن فی ایکڑ ایک ماہ پہلے ڈالیں اور اچھی طرح زمین میں ملا دیں۔ زمین تیار کرنے کے لیے ایک مرتبہ مٹی پلٹنے والا بل اور دو یا تین بار کلٹیو میٹر چلائیں اور بعد میں سہاگہ دے کر زمین کو ہموار کریں، بہتر ہے کہ کھیت کو لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کریں۔

## قسم، شرح بیج و وقت کاشت

لہسن کی منظور شدہ قسم لہسن گلابی ہے۔ درمیانے اور بڑے سائز کی صحت مند 200 کلوگرام پوتھیاں فی ایکڑ استعمال کریں۔ اکتوبر کا پہلا چندرہواڑہ لہسن کی کاشت کے لیے بہترین ہے۔

### طریقہ کاشت

تیار شدہ زمین کو پانچ مرلے کی ہموار کیا ریوں میں تقسیم کر لیں۔ پوتھیوں کو ہموار زمین پر لائنوں میں کاشت کریں۔ پوتھی کو زمین میں دو تین سینٹی میٹر یعنی ایک انچ گہرائی میں ڈالیں کہ جڑوں والا حصہ زمین میں اور نوکدار حصہ اوپر کی طرف ہو۔ پودوں کا باہمی فاصلہ 4 انچ جبکہ لائنوں کا درمیانی فاصلہ 8 تا 10 انچ رکھیں۔ بوائی سے پہلے پوتھیوں کو محکمہ زراعت کے مقامی عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ پھپھوند کش زہر لگائیں۔

### کھادوں کا استعمال

اچھی پیداوار کے لئے کیمیائی کھادوں کا استعمال بھی ضروری ہے کھادوں کی مقدار کا تعین کرنے سے پہلے زمین کا تجزیہ کروائیں تاہم اوسط زرخیزی والی زمین میں لہسن کی کاشت کے لئے دو بوری یوریا + دو بوری ڈی اے پی + ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ ڈالیں۔ فاسفورس اور پوٹاش کی ساری کھاد بوقت کاشت ڈالیں جبکہ نائٹروجنی کھاد کا ایک تہائی حصہ بوائی کے وقت جبکہ ایک تہائی پورے پتے نکلنے پر اور ایک تہائی گندھی بننے سے پہلے ڈال کر آبپاشی کریں۔

### جڑی بوٹیوں کی تلفی

لہسن کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا تدارک بوائی کے فوراً بعد زرعی ماہرین کے مشورہ سے مناسب زہر سپرے کر کے کریں۔ جڑی بوٹیوں کو بذریعہ گوڈی بھی تلف کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے فصل کو تین چار بار گوڈی کریں مگر جب فصل گندھیاں پورے سائز کی بنالے تو پھر گوڈی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

### آبپاشی

لہسن کی کاشت خشک زمین میں کریں اور کاشت کے فوراً بعد آبپاشی کر دیں۔ بعد ازاں آبپاشی ہفتہ وار جبکہ دسمبر اور جنوری کے مہینہ میں چودہ دن کے وقفہ سے آبپاشی کریں۔ جب فصل آخری مراحل میں ہو تو حسب ضرورت پانی لگائیں۔ بارش کے پانی کے نکاس کا بندوبست بہت ضروری ہے کیونکہ اس فصل کے پودے زیادہ مقدار میں پانی برداشت نہیں کر سکتے اور گندھیوں کے گل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔

## وقت برداشت اور حفاظت

لہسن عام طور پر اپریل میں برداشت کیا جاتا ہے۔ جب پتے خشک اور بھورے رنگ کے ہو رہے ہوں تو سمجھیں کہ فصل تیار ہے اور آپاشی بند کر دیں۔ لہسن کی برداشت وتر آنے پر کھر پوں کی مدد سے کریں۔ لہسن کو خشک کرنے کے لیے کسی سایہ دار جگہ یا ہوادار کمرے میں سات آٹھ دن کے لیے یکساں طور پر پھیلا دیں۔ جب اوپر سے چھلکے آسانی سے علیحدہ ہونے لگیں تو گٹھیوں کو ڈنڈیوں سمیت باندھ کر خشک اور ہوادار جگہ پر سٹور کر لیں۔ اس طرح لہسن لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔

## لہسن کی بیماریاں اور ان کا انسداد

نام بیماری	حملہ کی نوعیت	انسداد
لہسن کے پتوں کی چوٹی کا سفید جھلساؤ (White tip of Garlic)	اس بیماری کی وجہ (Cladosporium) ہے اور اس کا حملہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ بیماری سب سے پہلے لہسن کے پتوں کے سروں سے شروع ہوتی ہے اور پتے اوپر سے سُو کھنے لگتے ہیں۔ حملہ کی شدت میں تمام پتے خشک ہو جاتے ہیں جس سے لہسن کی گٹھیوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سفارش کردہ کھادوں کا استعمال کریں۔</li> <li>• پودوں کا باہمی فاصلہ سفارش کردہ ٹیکنالوجی کے مطابق رکھیں۔</li> <li>• جڑی بوٹیوں کی تلفی یقینی بنائیں۔</li> <li>• فصل کو پانی دن کے وقت لگائیں۔</li> <li>• بیماری کے ظاہر ہوتے ہی موٹی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل کسی پھپھوندکش زہر کا سپرے کریں۔</li> <li>• ایزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول بحساب 250 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ یا ایزوکسی سٹروبن پلس کلوروتھیلونل بحساب 500 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ یا فلو مارف پلس فوسٹائل ایلو مینیم بحساب 300 گرام فی ایکڑ</li> </ul>
لہسن کے پتوں اور تنے کا گلاؤ (Stem Blight) Stem Phyllium	یہ بیماری فصل پر عمر کے دوران ہی کے ہر حصہ میں حملہ آور ہو سکتی ہے لیکن مرطوب موسم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نم دار موسم میں اس بیماری کے جراثیم پتوں اور تنوں پر بھورے رنگ کے دھبوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں بعد میں ان کا رنگ سُرخ مائل سا ہو جاتا ہے اور متاثرہ پتے اور تنے گلنے سڑنے لگتے ہیں۔ بیماری کی شدت کی صورت میں پودا مر جاتا ہے۔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بیج کو بوائی سے قبل ہمیشہ پھپھوندکش زہر لگائیں۔</li> <li>• بیماری کی صورت میں مندرجہ ذیل زہروں میں سے کسی ایک سے زہر پاشی کریں۔</li> <li>• فوسٹائل ایلو مینیم بحساب 2 کلوگرام فی ایکڑ۔ یا آزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔</li> </ul>

<p>● کنگلی کے خلاف قوت مدافعت کی حامل اقسام کاشت کریں۔</p> <p>● پھپھوندکش زہرمانیکو بیوٹانال 50 گرام فی ایکڑ، ٹیکو نازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن بحساب 70 گرام فی ایکڑ یا تھائیوفینیٹ میتھائل پلس کلوروتھیونل بحساب 500 گرام فی ایکڑ یا ڈائی فینوکونازول پلس پروپی کونازول بحساب 200 گرام فی ایکڑ، یا ٹیب وکونازول پلس فلوٹریا فول بحساب 200 گرام فی ایکڑ یا ایزوکسی سٹروبن پلس کلوروتھیونل بحساب 500 گرام فی ایکڑ کا پانچ دن کے وقفے سے سپرے کریں۔</p>	<p>اس بیماری کی وجہ ایک پھپھوند (Puccinia) ہے۔ پتوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں طرف نارنگی رنگ کے ابھرے ہوئے دھبوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو بعد میں پھٹ جاتے ہیں اور نارنگی رنگ کا سفوف نما ختم ارد گرد پودوں پر گرتا ہے۔ اگر مسلسل اوس اور درجہ حرارت 20 سے 21 سینٹی گریڈ ہو تو بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، پتے چڑھڑھو کر سوکھ جاتے ہیں اور پیداوار میں کافی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔</p>	<p>لہسن کی کنگلی (Garlic Rust)</p>
---	--	--

## لہسن کے نقصان دہ کیڑے اور ان کا انسداد

انسداد	نقصان	پہچان	نام کیڑا
<p>● جڑی بوٹیاں تلف کریں۔ ● فصل کو گوڈی کریں۔ ● فصل کو سوکانہ آنے دیں کیونکہ خشک موسمی حالات میں اس کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ● حملہ معاشی حد سے بڑھنے پر کلور فینوپر 360 ایلس سی بحساب 75 ملی لیٹر فی ایکڑ یا سپانوسیڈ 240 ایلس سی بحساب 40 ملی لیٹر فی ایکڑ یا میتھول 140 ایلس پی بحساب 300 گرام فی ایکڑ اچھی طرح سپرے کریں۔</p>	<p>بالغ اور بچے دونوں نقصان پہنچاتے ہیں۔ حملہ شدہ پودے کے پتے چڑھڑھو کر ہو جاتے ہیں اور بعد میں خشک ہو کر گر جاتے ہیں۔ حملہ شدہ پودے پوتھیاں نہیں بناتے۔</p>	<p>بالغ کیڑے لمبوترے اور کالے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً ایک ملی میٹر ہوتی ہے۔ نر بالغ بے پر ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے پر لمبے نوکیلے اور پٹی جیسے ہوتے ہیں جن پر لمبے بال پھیلے کناروں پر ہوتے ہیں۔ شکل و شباہت میں بچے بالغ سے ملتے جلتے ہیں لیکن بے پر اور بھورے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑا پتوں پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔</p>	<p>تھرپس (Thrips)</p>

## زرعی معلومات کیلئے ہیلپ لائن اور ویب سائٹ

کاشتکار بہن و دیگر سبزیات کے کاشتی امور کے سلسلہ میں زرعی ہیلپ لائن 0800-15000 اور 0800-29000 پر روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک مفت فون کر کے مفید مشورے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ زراعت کی ویب سائٹ [www.agripunjab.gov.pk](http://www.agripunjab.gov.pk) سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے درج ذیل فون نمبرز پر رابطہ کریں۔

نمبر شمار	نام ادارہ	کوڈ نمبر	فون دفتر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر جنرل زراعت (توسیع و اڈاپٹو ریسرچ) پنجاب لاہور	042	99200732	agriextpb@gmail.com
2	ڈائریکٹر زراعت کوآڈینیشن (ایف ٹی و اے آر) پنجاب لاہور	042	99200741	dacpunjab@gmail.com
3	پلانٹ پتھالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جھنگ روڈ فیصل آباد	041	9201683	directorppri@yahoo.com
4	نظامت سبزیات ایوب زرعی ترقیاتی ادارہ جھنگ روڈ، فیصل آباد	041	9201678	directorvegetable@yahoo.com
5	انٹومالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد	041	9201680	director_entofsd@yahoo.com
6	ڈائریکٹر زراعت (ہائیکلچر توسیع)، لاہور	042	99203454	dahorticulture.ext@gmail.com

## ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر زونل دفاتر

نمبر شمار	نام ادارہ	کوڈ نمبر	فون دفتر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) شیخوپورہ	056	9200291	dafarmskp@gmail.com
2	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) گوجرانوالہ	055	9200200	daftgrw@gmail.com
3	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) وہاڑی	067	9201188	dafarmvehari@yahoo.com
4	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) سرگودھا	048	3711002	arfsgd49@yahoo.com
5	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) کروڑ، لیہ	0606	810713	daftkaror@gmail.com
6	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) رحیم یار خان	-	-	daftrykhan@gmail.com
7	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی و اے آر) چکوال	0543	571110	ssmsarfchk@hotmail.com

## دفا تر نائب نظامت زراعت (توسیع)

ای میل ایڈریس	فون نمبر	کوڈ نمبر	نام ضلع	نمبر شمار
doa_agriext_atk@yahoo.com	9316129	057	اتک	1
doaxtbp2010@gmail.com	9255184	062	بہاولپور	2
ddaextbwn@ygmail.com	9240124	063	بہاولنگر	3
doaxtbpkr@yahoo.com	9200144	0453	بھکر	4
doaxtckl@gmail.com	551556	0543	چکوال	5
ddaextdkg@gmail.com	9260143	064	ڈیرہ غازی خان	6
ddaextfsd@gmail.com	9200754	041	فیصل آباد	7
ddaextensiongrw@gmail.com	9200195	055	گوجرانوالہ	8
ddaeguajrat@gmail.com	9260346	053	گجرات	9
doagriextension@gmail.com	525600	0547	حافظ آباد	10
ddajhang@gmail.com	9200289	047	جھنگ	11
doaejlm@yahoo.com	9270324	0544	جہلم	12
doagriculturekwl@gmail.com	9200060	065	خانپور	13
doaxtkhb@yahoo.com	920158	0454	خوشاب	14
ddaeksr@gmail.com	9250042	049	قصور	15
doaelhr2009@yahoo.com	99200736	042	لاہور	16
doalodhran@gmail.com	9201106	0608	لودھراں	17
doaxt.layyah@gmail.com	920301	0606	لیہ	18
doaxtmultan@hotmail.com	9200748	061	ملتان	19
ddaagriextmzg@ygmail.com	9200041	066	مظفر گڑھ	20
doagri.extmwi@gmail.com	920095	0459	میانوالی	21
doa_extmbdin@yahoo.com	650390	0546	منڈی بہاؤ الدین	22

ای میل ایڈریس	فون نمبر	کوڈ نمبر	نام ضلع	نمبر شمار
doanarowal@yahoo.com	412379	0542	نارووال	23
doagriextok@live.com	9200264	044	ادکاڑہ	24
doapakpattan@gmail.com	383519	0457	پاکپتن	25
do.agriext.rwp.pk@gmail.com	9292160	051	راولپنڈی	26
doarajanpur@gmail.com	688618	0604	راجن پور	27
doagriryk@yahoo.com	9230129	068	رحیم یارخان	28
doaextskt@yahoo.com	9250311	052	سیالکوٹ	29
doaextentionsargodha@gmail.com	9230232	048	سرگودھا	30
doaextsahawal@yahoo.com	9330185	040	ساہیوال	31
ddaeskp@gmail.com	9200263	056	شیخوپورہ	32
doextension_nns@yahoo.com	2876960	056	ننکانہ صاحب	33
doagriextok@live.com	9201140	046	ٹوبہ ٹیک سنگھ	34
doaextvehari@hotmail.com	9201185	067	دہاڑی	35
chiniot.agri@yahoo.com	9210171	047	چنیوٹ	36

☆☆☆

تیار کردہ: نظامت زراعت کوآرڈینیشن (فارمز، ٹریننگ اور ایڈیوٹو ریسرچ) پنجاب لاہور۔ منظور کردہ: نظامت اعلیٰ زراعت (توسیع و ایڈیوٹو ریسرچ) پنجاب لاہور

شائع کردہ: نظامت زرعی اطلاعات پنجاب، 21۔ سرآغا خان سوئم روڈ لاہور

اشاعت: 2019-20

تعداد: 2000